

Stato mentale alterato

!	IN UN PAZIENTE SENZA PRECEDENTI PSICHIATRICI CONSIDERA SEMPRE LA POSSIBILITA' DI UNA CAUSA MEDICA O TRAUMATICA	!
---	---	---

- prendi sempre seriamente le minacce di suicidio o di violenza di questi pazienti
- Richiedi l'intervento delle Forze di Polizia

!	NON CERCARE DI INTERVENIRE SU UN PAZIENTE AGITATO SE PRIMA NON E' STATO SEDATO O NON E' TRATTENUTO CON LA FORZA: SE SI AGITA SIGNIFICA CHE NON E' IN IMMEDIATO PERICOLO DI VITA	!
---	--	---

- Crea una zona di sicurezza intorno al paziente per evitare che possa fare o farsi del male
- Informati da quanto ed in che modo sono comparsi i sintomi
- Informati se il paziente è un tossico o farmaco-dipendente
- Controlla la presenza di lesioni al capo

!	NON SOMMINISTRARE NULLA PER BOCCA A CHI HA SUBITO UN TRAUMA CRANICO	!
---	--	---

- Controlla se l'attività respiratoria è adeguata e se è necessario sostieni il respiro
- Controlla polso e pressione arteriosa

!	NON SOMMINISTRARE NULLA PER BOCCA AD UN PAZIENTE INCOSCIENTE	!
---	---	---

- L'EMT controlla uno stick glicemico:
 - se la glicemia è inferiore a 80 gr/l l'EMT somministra rapidamente ev 500cc di sol. glucosata al 5% ev (atto medico delegato dal responsabile del servizio)
 - se la glicemia è maggiore di 200 gr/l l'EMT somministra 500cc di soluzione fisiologica ev (atto medico delegato dal responsabile del servizio)

!	SE NON E' POSSIBILE ESEGUIRE UNO STICK GLICEMICO SOMMINISTRA COMUNQUE DELLO ZUCCHERO PER OS O EV	!
---	---	---

- Controlla una GCS
- Trasporta rapidamente in ospedale senza perdere tempo in accertamenti diagnostici sul posto