

## **BLS: reazione anafilattica**

- Controlla visivamente le vie aeree superiori per un edema del faringe
- Controlla la funzione respiratoria:
  - Dispnea
  - Rumori respiratori
  - utilizzo muscoli accessori del respiro
  - agitazione intensa
- Allenta tutti gli abiti stretti e toglie collane e monili
- Richiedi l'intervento di un equipaggio ALS anche se le condizioni non sembrano drammatiche (a meno che il pronto soccorso non sia raggiungibile in meno di 8 minuti)
- L'EMT incannula una vena con Ringer lattato o soluzione fisiologica a goccia lenta "solo per tenerla" (atto medico delegato dal responsabile del servizio)

<b>!</b>	<b>SE E' PRESENTE L'EMT DEVE SOMMINISTRARE BENETLAN 4MG EV E DUE PUFF DI PREPARATO CORTISONICO</b> (atto medico delegato dal responsabile del servizio)	<b>!</b>
----------	--	----------

- Se compare lo shock vedi il protocollo specifico
- Se necessario inizia respirazione bocca a bocca o ventilazione con Ambu
- Trasporta rapidamente in ospedale

<b>!</b>	<b>NON RITARDARE IL TRASPORTO PER ESEGUIRE SUL POSTO LE MANOVRE DI SOCCORSO</b>	<b>!</b>
----------	---	----------